

## Information om prostataprovtagning

Provbitar s.k. biopsier tas från prostatan med hjälp av ultraljudsledning.

Innan man tar provbitarna läggs **lokalbedövning** och Du har tagit **antibiotika** två timmar innan eller enligt annan ordination.

Man skall räkna med viss **blödning** från ändtarmen, från urinröret och i sperman. Detta kan vara oroande men går över spontant. Om Du dock får stor blödning med **koagler/blodlevrar** i urinen skall Du ta kontakt med oss eller söka Akutmottagningen.

Om Du senaste året vistats i länder med s.k. **multiresistenta bakterier** och haft magsjuka måste du underrätta oss om det innan provtagning. Vi behöver då säkra odlingsprover.

Det finns en liten risk att man kan drabbas av **infektion** i prostatan efter provtagningen. Om Du får feber över 38 grader vill vi att du tar kontakt med oss. **Om febern** är så **hög** som 38,5 eller däröver och Du har frossa måste Du genast **söka Akutmottagningen!** Du behöver då inläggning på **Urologkliniken** för behandling av bakteriell prostatainfektion med generell bakteriespridning, om det inte finns plats på Urologkliniken behöver Du under alla omständigheter erhålla intravenös s.k. bredspektrumantibiotika.

Denna allvarliga komplikation är dessbättre sällsynt men svår att förutse varför vi anser att man bör **planera provtagningen** så att marginal finns för Dig som patient. **Din säkerhet är viktig.**

Vi ser helst att Du **inte reser** långt inom fem dagar efter provtagningen.

Du får ett återbesök 11–14 dagar efter provtagningen för besked.

**Om Du behövt söka annan vårdgivare eller blivit inlagd i slutenvård i samband med provtagning vill vi få veta det, ring oss!**

Datum för provtagning .....

**Dr Bo Sjögren**

**Specialist i allmänkirurgi och urologi**